

Lifting endoscopique du front / lifting des sourcils

Le lifting endoscopique du front (« lifting frontal », « lifting des sourcils ») est une méthode esthétique et plastique peu connue, mais qui peut obtenir d'énormes résultats ! Un lifting endoscopique est effectué pour agir dans la partie supérieure du visage et plus particulièrement sur les sourcils tombants et les rides du front. Le but est la disparition des traits fatigués et tirés du visage. L'intervention peut être effectuée seule ou associée à un lifting complet du visage et un lifting des paupières. Dans certains cas, le lifting frontal peut avoir une influence positive sur les maux de tête fréquents.

Quelles sont les personnes concernées par un lifting frontal endoscopique?

Les hommes et les femmes possédant des sourcils tombants sont des candidats à un lifting frontal. Ceux-ci peuvent entraîner des traits fatigués et tirés du visage. Les rides très profondes du front peuvent également être lissées. La méthode classique avec une incision le long de la racine des cheveux n'est plus que rarement utilisée, notamment chez les personnes ayant un front haut (c'est-à-dire un grand espace entre les sourcils et la racine des cheveux).

Déroulement de l'opération de lifting frontal

Un lifting frontal endoscopique est effectué sous anesthésie générale (alternative : état de somnolence) suivi d'une hospitalisation à la clinique Erich Lexer. Quatre petites incisions au niveau de la racine des cheveux sont nécessaires pour éviter que les cicatrices soient visibles après l'opération. Par ce procédé. Le front et les sourcils sont lissés et tirés par rapport aux besoins et aux exigences individuels de chacun. La fixation de la peau, nécessaire à un résultat durable, se fait avec des fils et 2 petites vis vissées dans l'os du crâne, qui seront retirés sans problèmes au bout d'une semaine. L'intervention dure environ 1 heure ½.

Après l'opération

Il peut apparaître une sensation de tension pendant quelques jours, cela peut durer plusieurs semaines jusqu'à ce que l'œdème soit complètement résorbé. La réduction de la sensibilité disparaît en général au bout de quelques semaines. Il serait préférable de prendre une semaine de congés et d'éviter toute activité sportive pendant 2 semaines.

Du premier coup d'oeil

Durée de l'opération:

- environ 1 heure ½

Suites opératoires:

- 1 semaine de congés
- pas d'activités sportives pendant 2 semaines
- plusieurs semaines jusqu'à disparition complète de l'œdème

Type d'anesthésie:

- anesthésie générale (alternative : somnolence)

Hospitalisation:

- 2-3 jours

La consultation

Vos attentes et vos doutes seront discutés en toute tranquillité avec nos spécialistes lors d'un entretien concernant le lifting frontal endoscopique. Après l'entretien suivra un examen approfondi et une analyse de votre visage, plus particulièrement les parties autour des yeux et du front. Des photos seront effectuées qui serviront d'esquisse pour évoquer toutes les possibilités de l'opération. Nous voulons vous donner une idée la plus précise de ce qui vous attend.